jardins du nord

Cultures & Jardiniers du Nord de la France et de la Belgique

Bien arroser les légumes, variété par variété



Arroser l'aubergine

Signes de déshydratation : les feuilles sont molles et tombantes. Arrosez avant que la peau des fruits ne se ride.
Fréquence des arrosages : tous les 3 ou 4 jours, sur un sol paillé.
Qualité de l'eau : à la température extérieure, pour éviter l'avortement des fleurs.
Comment arroser : sur le sol autour du pied, sans mouiller les feuilles.

Arroser l'aneth

Besoin en eau : besoin en eau assez faible, sauf en cas de sécheresse. En cas de pluies régulières, **l'arrosage est même déconseillé,** car il y a des **risques de pourriture.**
Signes d'un manque d'eau : les feuilles et les jeunes pousses **se peuvent se déssécher rapidement.** Sans eau, la croissance de la plante ou la germination s'interrompent. Les feuilles perdent leur vigueur.
Qualité de l'eau : l'eau de pluie est conseillée à température ambiante.
Fréquence des arrosages : privilégier un arrosage hebdomadaire moyen que de petites quantités quotidiennes. **Arroser de préférence le soir.**

Arroser l'artichaut

Besoin en eau : besoin en eau important**, éviter l'excès qui peu favoriser la formation de pourriture.**
Qualité de l'eau : l'eau d'arrosage ne doit pas être trop froide ni trop calcaire.
Fréquence des arrosages : apport régulier en eau durant tout l'été. L'important étant de **ne pas laisser sécher la terre entre deux arrosages.** Un paillage peut aider à garder cette fraîcheur. **Arroser une fois par semaine en été** pour **arrêter totalement en l'hiver.**
Signe d'un manque d'eau : le manque d'eau entraine **une mauvaise qualité des têtes.** Il a besoin de beaucoup d'eau pour se développer.



Arroser le basilic

Besoin en eau : besoins importants en eau. Le sol et le terreau des potées doivent être maintenus frais.
Signe d'un manque d'eau : ses feuilles se flétrissent.
Qualité de l'eau : L'eau du robinet convient parfaitement, l'eau de pluie récupérée aussi, à température ambiante.
Fréquence des arrosages : arrosage fréquent, quotidien en période de sécheresse. Un **excès d'eau en période fraîche risque de le faire pourrir.** En été arroser de préférence le soir pour que l'évaporation soit moins importante. Au printemps et en automne, plutôt le matin.

Arroser la betterave

Besoin en eau : modéré.
Signes d'un manque d'eau : les **feuilles piquent du nez.** N'attendez **pas qu'elles jaunissent.** Les racines **deviennent fibreuses** par manque d'eau.
Qualité de l'eau : indifférente.
Fréquence des arrosages : une fois par semaine, si l'été est sec, pour ne pas favoriser une floraison précoce. **Éviter de mouiller le feuillage. Pailler** également le sol.

Arroser le brocoli

Besoins en eau : des besoins moyens, mais il **souffre du manque d'eau** autant que **de l'excès d'arrosage**. **Un paillage** peut s'avérer utile pour éviter l'évaporation et favoriser sa croissance.
Signes d'un manque d'eau : diminution des couleurs du brocoli.
Qualité de l'eau : pas d'exigence particulière. **Il n'aime pas les eaux acides**.
Fréquence des arrosages : après le repiquage, **arroser une ou deux fois par semaine** pour maintenir le sol frais et humide. A maturité, le brocoli à jet a besoin de moins d'eau un arrosage hebdomadaire suffira. **Arroser de préférence tard le soir ou tôt le matin.**



Arroser le cardon

Besoin en eau : moyen. **Il craint l'excès d'humidité.**
Signes d'un manque d'eau : Les feuilles se **flétrissent légèrement**. Les côtes deviennent **amères au goût.**
Qualité de l'eau : indifférente à température ambiante.
Fréquence des arrosages : En début de culture, après le semis et le repiquage, **arrosé régulièrement sans excès pour maintenir le terreau ou la terre légèrement humides.** En cas de sécheresse, veiller à ce **que la plante ne manque pas d'eau.**
Arroser en soirée pour éviter l'évapore avant que la plante ne l'absorbe.

Arroser la carotte

Signes de déshydratation : le feuillage se couche au sol.
Fréquence des arrosages : réguliers mais légers, pour favoriser la levée **et éloigner les araignées rouges, plus abondants et 1 fois par semaine** le mois qui suit le semis et en été, par temps sec.
Qualité de l'eau : indifférente.

Arroser le céleri branche

Signes de déshydratation : intervenez avant qu'il n'ait soif car **un manque d'eau nuit à son développement.** Ne le cultivez pas en sol ou en région sèche.
Fréquence des arrosages : 2 ou 3 fois par semaine, afin de **l'empêcher de monter à graines, paillez** aussi le sol.
Qualité de l'eau : indifférente.
Comment arroser : au pied des plantes, **ne mouillez pas les feuilles.**

Arroser le céleri-rave

Besoin en eau : il craint la sécheresse et nécessite des **apports d'eau réguliers** et **copieux** pour produire de grosses boules.
Signes d'un manque d'eau : la déshydratation se manifeste par une atrophie de la boule, alors que les racines se développent pour chercher l'eau.
Qualité de l'eau : utiliser plutôt **l'eau de pluie, à température ambiante** dans les réservoirs.
Fréquence des arrosages : arrosez **plutôt en matinée, en soirée** la formation d'une pellicule **est factrice de maladie.**
Au cours **du printemps et de l'été**, arroser régulièrement de façon à maintenir **la terre légèrement humide. Attention** à bien suivre l'arrosage et à éviter tout stress dû au manque d'eau pendant les 6 semaines précédant la récolte.

Arroser le cerfeuil

Besoin en eau : besoin **important particulièrement en été.**
Il déteste les terres sèches et aime que le sol reste frais, mais bien drainé, car il craint aussi la pourriture des racines due à l'eau stagnante.
Signes d'un manque d'eau : la croissance est **ralentie**, la plante **monte à graine** prématurément, le **jaunissement du feuillage**.
Qualité de l'eau : indifférente à température ambiante.
Fréquence des arrosages : arroser copieusement après le semis, ensuite régulièrement pendant toute la croissance pour **garder le sol humide.**
En période sèche, être vigilant à ce que l'arrosage soit suffisant.

Arroser la chicorée

Besoin en eau : le repiquage est un moment important, **où les petits plants ont avant et après l'installation, besoin d'un sol humide.** Ensuite, **l'arrosage doit être régulier,** car ce légume a **des besoins importants pour sa croissance. Pailler** dès les premières chaleurs.
Signes d'un manque d'eau : dès que les **feuilles s'affaissent légèrement.**
Qualité de l'eau : indifférente, ainsi qu'une température froide ou tiède.
Fréquence des arrosages : en l'absence de pluie, **un arrosage par semaine** en hiver convient, et **deux ou trois** dès que le temps se réchauffe. Maintenir une **humidité permanente** au niveau des racines. **Il est préférable d'arroser tôt le matin ou le soir, surtout par temps très chaud, afin de limiter l'évaporation et également d'éviter que le soleil ne brûle les feuilles.**

Arroser le chou d'hiver

Besoin en eau : important en eau. En période de sécheresse, **l'arrosage doit être important et régulier**. **Autrement, Il voit sa croissance perturbée et ses feuilles se fanent ou jaunissent.**
Qualité de l'eau : privilégier **l'eau de pluie**. **Eviter l'eau à des températures élevées.**
Fréquence des arrosages : garder la terre humide et fraîche pendant toute la période de végétation. En été, **en cas de sécheresse**, arroser **tous les soirs.**

Arroser le chou de Bruxelles

Besoin en eau : dans les régions septentrionales, le chou de Bruxelles a de faibles besoins en eau. S'il manque d'eau **les plants végètent, les fleurs se flétrissent et jaunissent.**
Qualité de l'eau : évitez l'eau stagnante, privilégier l'eau de pluie. L'eau du robinet convient aussi.
Fréquence des arrosages : juste repiqués ou plantés, les plants sont **particulièrement sensibles au manque d'eau.** L'arrosage doit être **régulier pendant quelques semaines,** afin **de maintenir le sol humide le temps de la reprise.** Par la suite, n'arroser qu'en cas de sécheresse.

Arroser le chou-fleur

Besoin en eau : légume gourmand qui **ne supporte pas le manque d'eau** et les périodes de sécheresse.
Signes d'un manque d'eau : La pomme des choux-fleurs ne grossit pas, voire se déforme.
Qualité de l'eau : Arrosez à l'eau de pluie.
Fréquence des arrosages : **maintenir la terre humide toute la saison.** En cas de sécheresse**, pailler avec du compost mûr et de l'herbe sèche, paille...,** Arroser **le soir, au pied de la plante.**

Arroser la ciboule et la ciboulette

Besoin en eau : moyens.
Signes d'un manque d'eau : frein ou arrêt de la croissance. En terrain **trop humide risquent de pourriture.**
Qualité de l'eau : l'eau de pluie, mais l'eau du robinet convient également.
Fréquence des arrosages : arrosez sans excès quotidiennement dans les quinze jours qui succèdent aux semis (jusqu'à la levée) et **dans la semaine qui suit un repiquage.** Ensuite n'arroser qu'en cas de sécheresse, le soir de préférence.

Arroser la coriandre

Besoin en eau : moyen. Arrosez **régulièrement sans gorger d'eau le sol** car elle risquerait de pourrir.
Signes d'un manque d'eau : **la montée en graine prématurée** est le signe que la coriandre manque d'humidité.
Qualité de l'eau : indifférent
Fréquence des arrosages : gardez **le sol humide** jusqu'à la levée. Ensuite un **arrosage hebdomadaire le soir**. En cas de température chaude et de sécheresse, **doubler la fréquence de l'arrosage et rester vigilant.**

Arroser le cornichon et le concombre

Signes de déshydratation : le feuillage se flétrit, les fruits sont moins fermes et les concombres sont plus amers.
Qualité de l'eau : à la température extérieure
Fréquence des arrosages : 1 ou 2 fois par semaine, en été. Paillez le sol..
Comment arroser : au pied, sans mouiller le feuillage, **pour éviter l'oïdium.**

Arroser la courge et la courgette

Signes de déshydratation : **les feuilles se penchent vers le sol,** en milieu ou fin de journée.
Fréquence des arrosages : abondants, pour abreuver le feuillage, **2 ou 3 fois par semaine.** Une fois de moins si vous paillez.
Qualité de l'eau : pas trop froide.
Comment arroser : au pied, **sans mouiller le feuillage, pour éviter l'oïdium.**



Bonne culture

Fiche : 2020 JDN jardins-du-nord.com