jardins du nord

Cultures & Jardiniers du Nord de la France et de la Belgique

Tableau des principaux engrais verts

Famille	Engrais	Type de sol	Lutte contre les maladies et insectes nuisibles	Inconvénients	Lutte contre les adventices	Effet sur la structure du sol	Semis	Date de l'enfouissement	Particularités	Divers
Polygonacées	Sarrasin	Acide			++++	améliore les sols lourds	mars à juin	début floraison	- Apporte beaucoup de matière organique. - Aère les sols en profondeur	Lutte parfaitement contre les mauvaises herbes.
Poacées (Graminées)	Seigle fourrager	Tous		croissance lente	++	améliore la structure du sol	septembre à octobre	A la fin de l'hiver	- Apporte beaucoup de matière organique. Stoppe la progression des mauvaiss herbes.	Pour jachère longue, a besoin d'être arrosé en période sèche. Assez difficile à enfouir - pas de problèmes de rotation
Brassicacées	Moutarde blanche	Tous	désinfectant du sol - tue le nématode de la betterave	attirent les ravageurs et maladies des crucifères : piérides, limaces, attention,	++++	pièges à nitrates dont ils empêchent le lessivage	août septembre	2 mois après la levée	- Croissance rapide - Production importante de matière organique - Facile à enfouir - Mellifère	stoppe la progression des mauvaises herbes
Brassicacées	Radis fourrager	Tous	désinfectant du sol tue le nématode de la betterave	ne pas planter avant ou après une crucifère, en raison de la rotation des cultures	++++		juin à septembre			
Brassicacées	Colza	Tous	désinfectant du sol		++++		août septembre			valable pour une jachère rapide. Enfouissement difficile en raison de ses racines
Fabacées	Vesce	Tous			+++	apporte de l'azote	août septembre mars à mai	3 mois après la levée	- croissance rapide	attention à l'excédent d'azote si vous utilisez du fumier - Gèle vers -10 ° C
Fabacées	Trèfle violet	Tous	- croissance assez lente - risque de repousse		++	apporte de l'azote	septembre octobre et mars avril	apparition des boutons floraux	- lutte contre l'érosion des sols - croissance assez lente - mélifère	Peut se tondre avant enfouissage - attention à l'excédent d'azote si vous utilisez du fumier
Hydrophyllacées	Phacélie	Tous	mellifère	attire les pucerons et aleurodes	+++	améliore la structure du sol	mars avril et en août	3 mois après la levée	- production importante de matière organique - système racinaire développé - stoppe la progression des mauvaises herbes	Valable pour une jachère rapide, facile à détruire à enfouir et jolie - Gèle vers - 5 / 6 ° C

Réussir sa technique :

Faucher et **broyer** l'engrais vert avant ou tout au début de la floraison (une tondeuse peut faire l'affaire)
Laisser sécher sur place avant de l'incorporer dans le sol superficiellement (quelques centimètres, ce n'est pas un béchage.
Arroser s'il ne pleut pas.
Attendre au moins 50 jours avant l'enfouissement
Enfouir et bêcher légèrement en incorporant du compost bien mûr et semer votre nouvelle culture de légume.
Ne pas semer un engrais vert de la même famille que la culture qui va suivre.



Bonne culture

Fiche : 2020 JDN jardins-du-nord.com
Pour en parler sur le forum : Créer un nouveau sujet dans "Au naturel "