Le framboisier : culture, entretien, récolte



Une espèce d'arbrisseaux couramment cultivée pour leurs petits fruits.

Nom latin

Rubus idaeus

Autre nom

Ronce du mont Ida

Famille

Rosacées

Période de plantation

La plantation commence **en automne**, dès le mois **d'octobre et peut s'étaler jusqu'en mars** (hors période de gel) mais tout dépend de la variété de framboisiers que vous avez choisie.

- Framboisiers à racines nues : octobre à mars
- boutures de racines : octobre à mars
- framboisiers en conteneur : toute l'année en privilégiant cette période

Qu'il s'agisse de **framboisiers remontants ou non remontants,** le calendrier est identique.

Où planter les framboisiers dans son potager ?

L'endroit doit **être bien choisi** car il ne s'agit pas d'une culture annuelle, une rangée de framboisiers peut **produire 6 à 10 ans** avant de voir son rendement diminuer et obligeant à en replanter ailleurs.

Sol : riche en humus, contenant une grande quantité de matières organiques et bénéficiant d'un bon drainage (les racines ne doivent être ni sèches, ni trempées)

Exposition : ensoleillée.

Plantation

- Creusez un trou bien plus grand que la motte du framboisier en conteneur.
- Placez au fond un compost bien mature.
- Placez le plant assez profondément.
- Les jeunes pousses vertes doivent être enterrées
- Rebouchez avec la terre du jardin.
- Tuteurez-le pour lui permettre un bon ancrage.
- Arrosez bien.

Si vous plantez plusieurs arbustes, au même endroit.

- Faites une tranchée en considérant 1,50 m entre chaque pied de plant.
- La tranchée doit être suffisamment profonde pour recevoir du compost et que les plants soient plantés suffisamment profondément.
- Répartissez correctement les arbustes, veillez à ce que les jeunes pousses vertes soient enterrées.

Entretien

- **Arrosage :** régulier l'été, mais **en petite quantité.**
- **Paillage :** un paillage peut-être mis en place après les tailles d'hiver, il doit être renouvelé régulièrement pour conserver son efficacité.
- **Fertilisation** : en automne et au printemps, mélangez du compost bien mature en le mélangeant avec la terre du pied du framboiser.

La taille du framboisier remontant

La taille a plusieurs objectifs **car le framboisier dégénère si on ne s'en occupe pas.**

- Favoriser la fructification en volume et en taille de fruit.
- Améliorer la récolte en privilégiant les plus belles branches.
- Permettre une bonne santé du pied.

Taille de juin

Limitez le nombre de tiges à une douzaine de belles branches par mètre.

Taille d'hiver

Supprimez les tiges faibles et les branches qui ont donnés des fruits au raz du sol. Ainsi que les branches qui s'éloignent de la souche dans une direction non-souhaitée à l'aide d'une bèche. D'année en année le pied de framboisier peut s'étendre et devenir difficile à maitriser.

La taille du framboisier non-remontant

Après la récolte, supprimez les tiges faibles et les branches qui ont donnés des fruits au raz du sol.

Taille d'hiver

Identifiez les plus belles branches à une douzaine sur un mètre et **rabattez-les à 1,5 mètre de hauteur.**
Coupez les **autres au raz du sol.** L'hiver, sélectionner les branches les plus vigoureuses et les plus saines en n'en retenant **10 par mètre linéaire**, puis couper les autres à la base. **Raccourcir celles restantes à 1,60 m env.** de hauteur selon la vigueur des plants.

La taille sert à apporter de la lumière au centre de l'arbuste et à l'aérer. Cela lui permet de sécher plus rapidement après une averse et réduit le risque de maladies fongiques. L'apport de lumière augmente également la quantité et la qualité des fruits.

Palissage

Palisser c'est « conduire » la plante sur une structure en y fixant les tiges ou les branches à l'aide de liens, pour favoriser la récolte ou la forme.

Il existe de nombreuse technique

Palissage en éventail


C'est le plus facile à réaliser, c'est un palissage à réaliser en espalier c'est à dire contre un mur, ou alors entre des câblés ou ficelles tendus entre 2 piquets de 1,80 m de hauteur, entre lesquels sont tendus des fils de fer tous les 40 cm.

Palissage à la hollandaise

Méthode plus originale qui offre une meilleure rentabilité, les branches sont installées sur 2 fils de fer parallèle entre 2 piquets espacés d'1 mètre. Les fils sont placés entre 50 et 70cm en hauteur. Les branches de l'année précédente sont attachées sur les fils, les nouvelles de l'année ne sont pas fixées.

Palissage en touffe libre

Prenez un morceau de treillage de 1,5 mètre de haut et placez-le autour du framboisier en formant un cercle d'un mètre de diamètre. Les tiges pousseront au travers du treillage et le dissimuleront.



Comment cerner le framboisier

- Avec une bêche, bien aiguisée, nettoyée et désinfectée,
- Faites le tour du pied en enfonçant la bêche,
- Il n'est pas nécessaire d'aller très profondément, les racines de framboisier sont proches de la surface,
- Ainsi vous coupez les racines afin de limiter leur développement.

Le paillage

En automne, couvrez le sol. Un paillis apporte une protection contre le gel nocturne, maintient l'humidité du sol et réduit la pousse de mauvaises herbes.

Pour ce paillis, vous avez de nombreuses solutions

- écorces de pin,
- tontes de gazon séché,
- feuilles mortes…

Fin février, début mars, retirez le paillis pour que les premiers rayons du soleil printanier réchauffent le sol.

À la mi-mai, vous pouvez à nouveau recouvrir le sol d'un paillis pour freiner la pousse de mauvaises herbes.

La multiplication

Plusieurs possibilités existent, la division des touffes, bouture des racines, bouture de rameaux. Mais la bouture des rameaux est d'une grande simplicité, et donne de bons résultats.

Quand pratiquer le bouturage

- **Au mois de juin** idéalement pour les boutures de rameaux feuillés
- **En automne** pour les boutures de racines.

Technique du bouturage

- Sur un **arbuste sain**, coupez **un des rameaux de l'année précédente.**
- Coupez le rameaux en plusieurs tronçons **justes au dessus des bourgeons**.
- Chaque bouture doit posséder **2 bourgeons.**
- Vous pouvez mettre de la poudre de bouturage (ou utiliser de l'eau de saule) sur la coupe qui sera plantée en terre.
- Préparez le sol **moitié terre de jardin, moitié sable.**
- Plantez verticalement les boutures **en les enfonçant jusqu'au premier œil.**
- Arrosez **régulièrement en très petite quantité.**

Ennemis

Les pucerons

S'installent au dessous des feuilles, les feuilles se déforment, changent de couleur. Les fruits peuvent être recouverts de miellat, désagréable et difficile à retirer des fruits

Traitements

La glue est alors un bon moyen, même si c'est un traitement préventif à faire rapidement en saison et à refaire après les pluies.
Le **savon noir,** lorsque l'arbuste est atteint, pulvérisez un mélange d'eau avec 10% de savon basique (sans additifs).
Le purin d'orties et le purin de consoude sont des préparations naturelles totalement biologiques.

Le ver des framboises

Ce sont les larves d'un coléoptère qui attaquent le framboisier et les ronces en général. Pour accéder au pollen les coléoptères adultes rongent les boutons floraux. On pourra alors voir les dégâts sur les fruits qui n'arriveront pas à terme ou seront mal formés.

Traitements

Le purin de tanaisie en pulvérisation préventive ou en traitement, on peut facilement éloigné l'insecte de l'arbuste fruitier. La tanaisie est d'ailleurs également efficace contre les pucerons.

Quelques variétés

Framboisiers remontants

« Héritage » variété ancienne, aux fruits rouge pâle, très parfumés, doux, sucrés et légèrement acidulés. **Les récoltes** se passent en aout et novembre.

« Marastar » une variété parfaite pour la culture en grand pot. Ses fruits sont beaux, rouges et très sucrés, doux, sucrés en nombre. **Les récoltes** se passent en juin et octobre.

« Zeva » c'est une variété qui ne nécessite pas de palissage. Ses fruits sont beaux et gouteux. **Les récoltes** se passent en juin et octobre.

« Fallgold » Framboisier jaune. Les fruits sont très sucrés et sans acidité, les enfants les adorent. **es récoltes** se passent en juin et octobre. La couleur jaune n'attirera pas les oiseaux.

Framboisiers non-remontants

« Malling Promise » Variété très vigoureuse qui impose un palissage, les fruits sont délicieux, d'un beau calibre. Ses saveurs sont tendres et sucrées.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Récolte

Les framboises sont tendres et fragiles, évitez de les entasser lors de la cueillette. Placez-les dans un panier peu profond plutôt que dans un seau. Mangez ou utilisez les framboises rapidement après la cueillette. Elles se conservent deux jours maximum au réfrigérateur.



Bonne culture

Fiche : 2020 JDN jardins du nord.com

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=18&t=3183&p=41315#p41315

Photo : du net