Les champignons : Le satyre puant





Au départ ce curieux champignon a l'aspect d'un œuf blanc, gélatineux en surface, d'une taille légèrement supérieure à une balle de ping-pong, fixée au sol par un cordonnet mycélien ("racine").

Nom latin

Phallus impudicus

Autres noms communs

Le **satyre puant** ou **phallus impudique,** parfois nommé **morille du diable**, **fausse morille (verte)** ou **œuf du Diable**

Famille

Phallacéacée

Division

Basidiomycètes

Cet œuf pousse souvent sous la surface et/ou affleure le sol.
La seule partie comestible de ce champignon est le cœur de l'œuf à l'état juvénile. C'est alors comme un noyau de la taille d'une noisette avec une saveur de petit pois frais ou de radis fort selon les sensibilités. Elle se déguste sur place à la pointe du couteau.
A maturité, cet œuf s'ouvre en une nuit et il en sort un pied vertical, blanc, creux à l'intérieur, surmonté d'une tête conique d'abord verdâtre puis noire, recouverte d'une "gelée" très malodorante qui attire les mouches. L'enveloppe de l'œuf reste attachée à la base, comme une volve d'amanite.
Très commun dans les bois **d'avril à octobre**, le satyre puant dégage une odeur de charogne perceptible à plusieurs centaines de mètres. On peut parfois interpréter cette odeur pour la présence d'un cadavre en putréfaction...
En fait cette odeur abominable est un moyen de propagation de l'espèce : elle provient de la gelée qui contient les spores. Ces derniers sont ingérés par les grosses mouches attirées par cette odeur. Les spores seront alors disséminées par leurs déjections.

Chapeau

3 à 4 cm, conique, tronqué au sommet par un petit cercle, alvéolé et blanc mais entièrement recouvert au début d'une gléba vert-olive à noirâtre. Celle-ci attire les mouches qui l'emportent, disséminent ainsi les spores, et mettent à nu les alvéoles blanches.

Pied

10 à 20 cm sur 2 à 4 cm de diamètre, allongé et s'amincissant graduellement vers le haut, blanc, alvéolé, creux, caverneux et fragile, il s'affaisse fréquemment au bout de quelques jours. Il est chaussé d'une volve, reste de l'œuf éclaté.

Chair

Blanche et poreuse, inodore en elle-même. En revanche la gléba, tant qu'elle est présente, répand une odeur pestilentielle de cadavre que l'on sent à plusieurs mètres à la ronde avant même d'avoir aperçu le champignon.

Exhalaison

Nulle à l'état d' "œuf" original (parfum agréable de radis à la coupe à ce stade de développement) puis odeur pestilentielle donnant l'impression d'un mélange de fuite de gaz et de soufre se dégageant à plusieurs mètres à la ronde lorsque l'espèce vient "d'éclore" !

Période de cueillette

Milieu du printemps et jusqu'à l'automne

Biotopes

Il se développe tant dans les bois de feuillus que de résineux, le plus souvent aux alentours des vieilles souches mais aussi, exceptionnellement sur vieilles souches ou troncs en décomposition.



Confusions possibles

À l'état juvénile (dans la forme ovée) **avec l'anthurus d'Archer et le clathre rouge ainsi qu'avec d'autres phalles s'il est de petite taille mais** impossible à maturité, ne fut-ce qu'en raison "du caractère" odorant !



Bonne découverte et soyez prudent



Fiche : 2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche d'Eveliotis)

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=106&t=13106

Photos : du net