Les principales adventices : Berce du Caucase



Elle une espèce d'origine ornementale qui a été plantée pour ses vertus esthétiques et mellifères. Elle se disperse dans l'environnement et **envahit les bords de route, les berges de rivière, les lisières forestières et les prairies gérées de manière extensive.** Elle affectionne particulièrement les milieux ouverts au sol riche, frais et profond.
Elle forme des populations très denses qui prennent le pas sur la flore indigène.

Nom latin

Heracleum mantegazzianum

Autres noms

Berce de Mantegazzi

Famille

Apiacées

Description

Hauteur du plant : de 2 à 5m

Inflorescence :

- Ombelle principale composée de 50 à 150 rayons
- Diamètre des ombelles de 20-50 cm
- Fleurs blanches parfois roses

Tige :

- Poils blancs rudes, épars, présents surtout à la base des tiges foliaires
- Taches rouge framboise à violet, nombreuses, bien définies et étendues
- Tige robuste, cannelée, creuse Diamètre de 4-10 cm

Feuille :

- Divisée en 1 à 3 folioles, profondément découpée et dentée
- Pétioles des folioles inférieures de moins de 10 cm

Feuille, face inférieure :

- Lisse à légèrement écailleuse, peut porter des poils blancs et rudes, épar



L'éradication de la Berce du Caucase nécessite le port d'un équipement approprié. Consulter des spécialistes avant d'agir.

La Berce du Caucase produit une toxine photo-toxique qui provoque des brûlures et une inflammation de la peau

Symptômes

Après un contact avec la sève de la plante et sous l'effet de l'exposition au soleil ou au banc solaire, des lésions de la peau se développent en quelques jours. La peau devient rouge, gonflée, et des grandes bulles (cloques) mettent un à deux jours à apparaître. Les lésions ont l'aspect d'une brûlure. Après guérison, des taches brunes peuvent persister: on parle d'hyperpigmentation résiduelle.

Traitement

- Même si la peau paraît normale au moment du contact, **laver soigneusement la peau.**
- Changer de vêtements s'ils ont été contaminés par la sève de la plante.
- L'effet de sensibilisation persiste plusieurs jours. Éviter toute exposition au soleil pendant une semaine environ: manches longues, pantalons, chapeau
- Protéger les zones exposées à la lumière solaire par une crème à haut indice de protection (50-60). Surveiller l'apparition d'une réaction: si la peau devient rouge ou gonflée, consulter le médecin traitant ou un dermatologue.

Confusion possible

Il ne faut pas confondre ***la berce du Caucase*** avec ***la Berce commune*** (*Heracleum sphondylium)*, une espèce autochtone et abondante en Europe qui affectionne les mêmes milieux, et qui peut sporadiquement se montrer envahissante en tant que mauvaise herbe.

L'angélique sauvage (Angelica sylvestris) et l'angélique vraie (Angelica archangelica) peuvent être assez grandes, et sont parfois confondues avec ***les grandes Berces invasives,*** bien qu'elles soient bien moins massives et s'en différencient aisément par leurs feuilles nettement composées de folioles.

Éradication

Si vous pensez avoir aperçu ***une berce du Caucase***, dans votre jardin, **surtout n'y touchez pas. "*Pas d'arrachage à main nue, pas de débroussailleuse, de tondeuse… C'est dangereux ! Et ne pas emmener ça non plus au parc à conteneurs !*** Le bon réflexe est de commencer par prévenir la commune, qui avertira une équipe spécialisée.



Soyez prudent

Fiche : 2020 JDN jardins du nord.

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=3&t=12186&p=219445=berce#p219445

Photo : du net